

BENESSERE INTIMO

BIORIVITALIZZANTI

BIOSTIMOLANTI

SOLLIEVO ANORETTALE

Lubrigyn[®] Intima



Emulgel lenitivo e calmante
per il benessere intimo e sessuale

CBD + CBG COMPLEX - ACIDO IALURONICO - BETAGLUCANO



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
EVIDENZE SCIENTIFICHE

uniderm
italy

Lubrigyn[®] Intima



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Tubo da 40 ml



Emulgel lenitivo e calmante per l'area vulvare

- Allevia il dolore
- Contrasta l'infiammazione tissutale
- Riduce il fastidio e il bruciore



PRINCIPI ATTIVI

CBD (Cannabidiolo)

Analgesico

CBG (Cannabigerolo)

Antinfiammatorio, analgesico

Acido ialuronico e Betaglucano

Iidratante, emolliente



POSOLOGIA

- Applicare una modica quantità di emulgel sull'area esterna interessata, distribuendo uniformemente e massaggiando delicatamente.
- Utilizzare **una o due volte al giorno**, o secondo necessità.

Lubrigyn[®] Intima

EVIDENZE SCIENTIFICHE



1

DISPAREUNIA

Indagine clinica sperimentale.¹



3 minuti
dopo l'applicazione

89% Risoluzione del dolore (risultato VAS tra 6-7)

21% Riduzione del dolore (risultato VAS tra 8-10)



30 minuti
dopo l'applicazione

98% Risoluzione del dolore (risultato VAS tra 6-7)

66% Riduzione del dolore (risultato VAS tra 8-10)

E' stata condotta un'esperienza clinica su 45 donne con un livello di percezione del dolore al rapporto sessuale compreso tra 6 e 10 misurato con scala di Vas.

2



VESTIBULODINIA e VULVODINIA

Studio Osservazionale, sulla efficacia del Cannabidiolo (CBD) per uso topico.²

È stata indagata la risposta terapeutica su 187 pazienti affette da Vestibulodinia e Vulvodinia trattate con CBD mediante preparato topico in dosaggio bi-giornaliero.

CRITERI DI INCLUSIONE

Parametri Oggettivi


- 1) Swab test positivo – Allodinia.
- 2) Valutazione ipertono muscolare vulvo-perineale con osservazione e test digitale.

Parametri Soggettivi

Valutati con Scala di Marinoff (0 - 1 - 2 - 3).

87%

Dei soggetti, che si collocava inizialmente sul livello massimo della Scala di Marinoff (score 3 ovvero impossibilità di rapporto penetrativo), dopo 6 mesi lo troviamo a livello 0.



3



DOLORE PELVICO CRONICO

Trial clinico.³

È stata condotta una ricerca clinica per valutare l'efficacia di una crema topica a base di CBD, a diverse concentrazioni (2,5% e 5%), nel dolore acuto e cronico. Il trial è stato condotto su 22 pazienti che hanno applicato la crema fino a 4 volte al giorno, per 14 gg.

RISULTATI

Dopo l'applicazione della crema topica al CBD, è stata registrata una significativa e consistente riduzione del dolore.

-32% Del dolore su una scala di VAS da 1 a 10

Lubrigyn[®]

Intima

Emulgel lenitivo e calmante
per il benessere intimo e sessuale

CBD + CBG COMPLEX
ACIDO IALURONICO - BETAGLUCANO



Tubo da 40 ml

MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Applicazione locale:** Utilizzare una o due volte al giorno, o secondo necessità.
- **Elettroporazione:** 2 sessioni di trattamento a settimana della durata di 20 minuti ciascuna, per un 4/8 settimane a seconda della patologia da trattare e del quadro clinico.

Q&A

- Utilizzabile in gravidanza e allattamento
- Non compatibile con il profilattico
- Compatibile con diaframma e coppetta mestruale
- Per la gestione di irritazioni post epilazione/rasatura
- Sicuro per il Drug test

BIBLIOGRAFIA:

1. Indagine clinica sperimentale, F.Frascani, M.Angelucci, A.Crisuolo, A.Lusi. 2. MD Rossana Cirillo, MD Daniela Paolucci, MD Francesco Puppo, Studio Osservazionale sulla efficacia del Cannabidiolo (CBD) per uso topico in una popolazione affetta da Vestibulodinia (80% delle pazienti affette da Vulvodinia), ABSTRACT CONGRESSO VULVODINIA - 4 NOVEMBRE 2022, ROMA. 3. Larry Good, David Bensol, Mike Ferguson, Topical CBD for the Management of Acute and Chronic Pain: A Brief Review and Report of an Open-Label Dose-Ranging Clinical Trial. Chem Pharm Res. 2019; 1(2): 1-8.

uniderm
italy