

ANTIMICOTICI

BIORIVITALIZZANTI

BIOSTIMOLANTI

SOLLIEVO ANORETTALE



Dispositivo Medico CE Classe III - 6 ovuli da 3 gr

Per lesioni e alterazioni distrofiche vaginali

ANTINFIAMMATORIO - CICATRIZZANTE



L'INNOVATIVO APPROCCIO TERAPEUTICO A BASE DI POLIDEOSSIRIBONUCLEOTIDE-PDRN

OBIETTIVO

Questo studio ha valutato la capacità del polidesossiribonucleotide (PDRN) di ripristinare il flusso sanguigno e migliorare la guarigione delle ferite, agendo attraverso il recettore A2A, in un modello animale di lembi cutanei ischemici.

MATERIALE¹

- ✓ Il prodotto utilizzato negli casi di studio è il **polideossiribonucleotide-PDRN a base di sale di sodio e derivato dalle gonadi di storione**, il cui componente biologicamente attivo è l'acido desossiribonucleico naturale altamente purificato.
- ✓ Il **PDRN** viene solitamente estratto dalle gonadi dell'animale di origine **mediante** un processo brevettato e purificato ad alta temperatura, ottenendo **un principio attivo puro > 95%** con proteine e peptidi inattivati, che **garantisce la sicurezza del prodotto e l'assenza di effetti collaterali immunologici**.

METODO¹

- ✓ Per **testare la funzionalità del PDRN** nel lembo ischemico, i parametri utilizzati sono stati:



RANDOMIZZAZIONE:
-PDRN 50 %
-Veicolo 50%




**ANALISI
ISTOLOGICA**

1



Polydeoxyribonucleotide restores blood flow in an experimental model of ischemic skin flaps

JOURNAL OF VASCULAR SURGERY Volume 55, Number 2 - Polito F., Bitto A., Galeano M., Irrera N., Marini H., Cal. M., Squadrito F., Altavilla D.


Il punteggio istologico di spessore del tessuto di granulazione, rappresentato nel grafico E e la rigenerazione epidermica del grafico F, sono stati valutati al giorno 10 evidenziando che il PDRN rispetto al veicolo, ripristina il flusso sanguigno e l'architettura del tessuto.




La valutazione istologica (ematossilina ed eosina) della ferita cutanea ottenuta da lembi ischemici mostrata al giorno 5 e 10 dopo l'intervento chirurgico (ingrandimento originale x 10).




Lembo ischemico con veicolo al giorno 5 mostra l'assenza di un processo di guarigione e un marcato infiltrato infiammatorio.



Lembo ischemico + PDRN al giorno 5 mostra un processo di guarigione ancora incompleto.



Lembo ischemico con veicolo al giorno 10 mostra un cattivo processo di guarigione, con un prolungato infiltrato infiammatorio.



Lembo ischemico + PDRN al giorno 10 mostra una guarigione completa e una normale architettura del tessuto.



Nella gestione delle lesioni vaginali è fondamentale un trattamento farmacologico a base di POLINUCLEOTIDI dalle spiccate attività antinfiammatorie e riparatrici.



PRINCIPI ATTIVI

Polinucleotidi: antinfiammatori e riparatori delle cellule epiteliali



POSOLOGIA

Lilith® Ovuli

Utilizzare un ovulo al giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi, o secondo prescrizione medica.

La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi; se necessario, può essere utilizzato anche per periodi prolungati.



Dispositivo Medico CC Classe III - 6 ovuli da 3 gr